



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Ο ΗΠΑΤΟΚΥΤΤΑΡΙΚΟΣ ΚΑΡΚΙΝΟΣ;

Με τον όρο «Ηπατοκυτταρικός Καρκίνος», αναφερόμαστε στον ανεξέλεγκτο πολλαπλασιασμό κυττάρων στο ήπαρ. Σε περίπτωση που ο καρκίνος ξεκινήσει από το ήπαρ, ονομάζεται πρωτοπαθής, ενώ εάν εξαπλωθεί από άλλο όργανο, ονομάζεται μεταστατικός.

Το Ηπατοκυτταρικό Καρκίνωμα είναι ο συνηθέστερος τύπος πρωτοπαθούς καρκίνου του ήπατος. Πιο συγκεκριμένα το ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα είναι τέσσερις με οκτώ φορές πιο συχνό στους άντρες από ό,τι στις γυναίκες και αυτό, μάλλον, αντανακλά διαφορετικές συνήθειες που αφορούν τους παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την ανάπτυξή του. Οι άντρες, τέλος, έχουν 3 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο ανάπτυξης ΗΚΚ από ότι οι γυναίκες.



ΒΑΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ



Η ΚΙΡΡΩΣΗ ανεξάρτητα αιτίου συνιστά το βασικότερο παράγοντα κινδύνου.
ΤΟ 85% ΤΩΝ ΗΚΚ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΚΙΡΡΩΣΗ ΤΟΥ ΗΠΑΤΟΣ.



ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΕΣ ΛΟΙΜΩΞΕΙΣ ΑΠΟ ΗΠΑΤΙΤΙΔΕΣ B & C οδηγούν συχνά σε κίρρωση, η οποία με τη σειρά της ενδέχεται να επιφέρει τον καρκίνο. Ωστόσο, από τον ίό της ππατίτιδας Β μερικές φορές μπορεί να προκληθεί καρκίνος χωρίς να μεσολαβήσει το στάδιο της κίρρωσης.



ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ.

ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΒΗΤΗΣ. Οι δύο αυτές μεταβλητές, συχνά οδηγούν σε μη αλκοολική λιπώδη νόσο του ήπατος (NAFLD), καθώς και στην χειρότερη μορφή της νόσου, τη μη αλκοολική στεατοπατίτιδα (NASH). Η τελευταία δύναται να οδηγήσει σε ηπατοκυτταρικό καρκίνο.



ΑΥΤΟΑΝΟΣΑ ΗΠΑΤΙΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ, όπως η Αυτοάνοση Ηπατίτιδα, η Πρωτοπαθής Χολική Χολαγγείτιδα (PBC), καθώς και η Πρωτοπαθής Σκληρυντική Χολαγγείτιδα (PSC).



ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ, όπως ο νόσος Wilson.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΆΛΛΟΥΣ ΤΟΞΙΚΟΥΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ, όπως στεροειδή και αναβολικά.

